

Современные наркотические средства

Как распознать?

Что делать?

Общешкольные информационные собрания в рамках программы профилактики употребления ПАВ среди подростков по инициативе Общественного Фонда «Свободные Люди» и Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД РК (исх. № МВД-1-21-6-76/4520-И)

Наркомания БЫЛА



Наркомания СТАЛА



ТРАМАДОЛ

синтетический опиоидный анальгетик
синтетический опиат героина

- Продается в аптеках
- Не относится к списку наркотических веществ, а следовательно не попадает под юрисдикцию УБН
- Вызывает опиоидную наркоманию
- Держится в моче до 8-ми часов
- Вызывает эйфорию и эмпатийное состояние, аналогичное «экстази», которое длится 12-36 часов.
- Подросток ощущает эмоциональную восприимчивость, желание помогать окружающим, прилив бодрости, раскованность

ТРАМАДОЛ

синтетический опиоидный анальгетик
синтетический опиат героина

СИМПТОМЫ АБСТИНЕТНОГО СИНДРОМА

- головная боль;
- повышенное давление;
- жар и озноб;
- потливость;
- ломоту в теле;
- боль в мышцах;
- учащенное сердцебиение
- расстройство пищеварения
- апатия, депрессия

- **ЛОЖНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ**

СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ

«легалка», спайсы, курительные смеси, скорость, спид и пр.

JWH (джи-ви-аш)

синтетический канабиноид
синтетический аналог марихуаны


СОЛЬ (МДПВ)

метилендиоксипировалерон, содержит
аналоги мефедрона

- постоянное появление новых формул затрудняет отнесение к списку наркотических веществ
- не прогнозируемо действует на организм, что увеличивает процент передозировок
- вызывает необратимые последствия для психики
- Эффект держится от 2-х часов до 2-3 суток
- в моче держатся до 7-ми дней

JWH (джи-ви-аш)


синтетический канабиноид
синтетический аналог марихуаны



СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ

«легалка», дживиаш, спайсы, курительные смеси, скорость, спид и пр.

- снижение концентрации внимания, нарушение мышления, потеря смысла в разговорах
- неряшливость, отсутствие самокритики
- частое появление приподнятого настроения, аномальная энергичность
- бессонница, нарушения поведения
- слишком эмоциональная речь
- излишняя смелость, хвастовство, бравада, высокомерие
- резкие перепады настроения – от эйфории до агрессии



СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ


«легалка», дживиаш, спайсы, курительные смеси, скорость, спид и пр.

СИМПТОМЫ АБСТИНЕТНОГО СИНДРОМА

- истерики, капризы, депрессия вплоть до попыток суицида
- потеря веса
- безумный взгляд, речевые дефекты
- мания слезки, тревога
- постоянная жажда. Бессонница становится выраженной, аппетит пропадает.
- психические расстройства, шизофрения



СМАРТФОН



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
МЕССЕНДЖЕРЫ



Telegram



АНОНИМНАЯ
ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА



QIWI
КОШЕЛЕК



ЗАКЛАДКА В
ВЫБРАННОМ
РАЙОНЕ ГОРОДА



КАК РЕКЛАМИРУЮТ ПРОДАЖУ



ТРАФАРЕТНЫЕ НАДПИСИ
НА ЗАБОРАХ
И
СТЕНАХ ДОМОВ

КАК РЕКЛАМИРУЮТ ПРОДАЖУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ
ПОСТЕРЫ В МЕТРО



КАКИМИ НАВЫКАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ РЕБЕНОК?

- Умение решать проблемы и справляться с трудностями
- Коммуникабельность
- Умение сдерживать гнев и контролировать проявление негативных эмоций
- Умение взаимодействовать с окружающими
- Чувство собственного достоинства
- Эмоциональный контакт в семье

КОГДА НАДО НАЧИНАТЬ ВОЛНОВАТЬСЯ?

(косвенные признаки употребления)

- Резкое снижение успеваемости
- Увеличение количества прогулов
- Ложь
- Смена круга общения (новые друзья)
- Скрытность, в том числе разговоров по телефону
- Регулярные перепады настроения
- Нарушения сна, раздражительность, вялость, апатия
- Нехватка карманных денег